



Mouxine Maggots

Insecticide larvicide



FACILE D'EMPLOI

forme granulé



LARVICIDE

mouches et moucheron



LONGUE DURÉE D'ACTION

efficace pendant 4 à 6 semaines



ACTIVITÉ

contact et ingestion

80% des problématiques insecticide dans les élevages passent en priorité par la gestion du stade larvaire. En complément de Mouxine Maggots, utiliser un insecticide adulticide en traitement des surfaces ou pour l'environnement : Mouxine Secure SG, Mouxine Twenty One, Mouxine Appâts.

Caractéristiques

- Contient de la cyromazine, un insecticide larvicide de la famille des triazines.
- Bloque la synthèse de la cuticule épidermique de chitine des larves ce qui provoque leur mort.
- Utilisable en épandage à sec, en pulvérisation ou en arrosage pour une protection d'environ 4 à 6 semaines.
- Très facile d'emploi et s'utilise dans tous les bâtiments d'élevage.

Composition

- Cyromazine
n° CAS : 66215-27-8 : 20 g/kg

Propriétés physico-chimiques

- Etat physique : granulés solides blancs

Efficacité

Doses d'emploi élevage

- 250 g pour 10 m² de surface à traiter

Mouxine Maggots



HUVEPHARMA®

We add performance to your business

Mode d'emploi

Dose d'application pour 10m² de surface traitée

- Surface liquide ou très humide : 250g en épandage à sec.
- Surface peu humide : 250g mélangés dans 1 à 4L d'eau (selon l'humidité) appliqués au pulvérisateur.
- Sur litière sèche : 250g mélangés dans 10L d'eau appliqués à l'arrosoir.

Répéter le traitement toutes les 4 à 6 semaines.

Traitement en exploitation porcines

- Traiter directement toute la surface après l'évacuation du lisier et/ou du fumier.
- Sur les caillebotis partiels, le traitement peut se faire par épandage à sec.
- En cas de nécessité à traiter sur un lisier ou un fumier avec une croute en surface, le produit doit être appliqué après dilution dans de l'eau, avec un arrosoir ou un pulvérisateur.

Traitement en exploitation bovines



- Traitements par épandage à sec sur les caillebotis, les lisiers et les fumiers très humides.
- Traitements par pulvérisation autour des logettes et aux bords des murs (50cm).
- Traitements après mise en place de la nouvelle litière avec un arrosoir.

Traitement en exploitation de volailles

- Traitement par épandage à sec sur les caillebotis.
- Traitement par pulvérisation ou arrosage sur les surfaces paillées.

Pour une lutte efficace, réaliser un traitement adulticide avec Mouxine Secure SG ou Mouxine Twenty One en complément du traitement avec Mouxine Maggots.

Zone d'application préconisée



Réglementaire

- Produit biocide insecticide TP18

Présentations

Seau de 5 kg
Sac de 10 kg
Sac de 20 kg



Conditions de stockage et d'utilisation

- Durée de conservation : 2 ans.
- Stocker dans un local frais, sec, bien ventilé et à l'abri du gel.
- Réservé à un usage professionnel.
- Porter des gants lors de la manipulation du produit, se laver les mains après chaque utilisation.
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau additionnée de détergent.
- L'applicateur doit porter des Equipements de Protection Individuelle pour l'utilisation du produit.
- Utiliser les biocides avec précautions. Consulter la fiche de sécurité et l'étiquette avant toute utilisation.

Mouxine Maggots