


LA PERIODE CLE :

=>DE 2 MOIS AVANT A 1 MOIS APRES LA MISE-BAS<=



Découvrez ci-après :

nos conseils et solutions pour toutes ces thématiques



Pensez à nos outils de diagnostics :

- Analyse de fourrage
- Profil métabolique (dosage oligo-éléments vitamines)
- Parasitisme : Coproscopies, Sérologies grande Douve
- Colostrum : Pesée colostrum, Dosages, IgG des veaux

Des actions commerciales sont en place pour cette campagne – contactez nous



PRÉPARATION DE LA MÈRE AU VÊLAGE

Entre 1 mois avant et 1 mois après le vêlage, les apports à la future mère ne doivent absolument pas varier en termes d'équilibre énergétique pour ne pas s'exposer à un déficit immunitaire autour du vêlage


MAT	De 13 à 14
NEC	Entre 3 et 3,25
BACA	Proche de 0 voire négatif 15j-3sem avant vêlage

ALIMENTATION ET APPORT EN OLIGO ÉLÉMENTS

La bonne santé du veau se joue déjà dans les 2 mois précédents sa naissance. Les aliments distribués aux vaches en fin de gestation ont un effet déterminant sur le déroulement du vêlage, la qualité du colostrum, puis le démarrage de la lactation.



DÉPARASITAGE



STRONGLES
PARAMPHISTOME

Optimiser l'efficacité alimentaire et la croissance, favoriser les défenses immunitaires contre les agents infectieux et améliorer la réponse à la vaccination.

PETITE DOUVE
GRANDE DOUVE

Eviter un déficit de qualité du colostrum, de pertes de croissance, de fertilité et de production laitière, une dégradation de l'état général.

POUX
GALE

Empêcher les démangeaisons, les lésions cutanées, les anémies, la baisse de GMQ, les pneumonies

MOUCHES
MOUSTIQUES
TAONS

Réduire les risques de myiases, limiter la propagation des maladies vectorielles FCO 3-8, MHE, DNC...



VÊLAGE

Aire de vêlage dédiée, curée et désinfectée après chaque vêlage
Paillage abondant - surface mini : 4 m x 4 m, ensemencement flore positive

ACTUALITÉS

Le recours aux antiparasitaires doit faire l'objet de maîtrise et de raison

GESTION COLOSTRALE

La prise de colostrum de bonne qualité et en quantité suffisante est primordiale pour le transfert d'immunité et d'énergie



Testez-le :




Très bon	Valeur Supérieure à 28%
bon	Valeur Inférieure à 28%



PRÉVENTION

=> PROTÉGER LE VEAU ET DÉVELOPPER SON IMMUNITÉ DES LES PREMIERS JOURS DE VIE <=>

Couverture/Risque infectieux



Les veaux naissent sans aucune défense

Assurez l'immunité des mères est essentiel

Pour réduire la pression d'infection dans leur environnement

Pour transmettre aux veaux des défenses de qualité par le colostrum

1 Diminution de la pression microbienne
> Hygiène, désinfection et ambiance (ventilation...)

2 Transfert passif d'immunité par le colostrum
 ➤ Préparation vêlage (ration équilibrée, gestion parasitisme)
 ➤ Vaccination des mères adaptée (respiratoires, diarrhées)
 ➤ Distribution d'un colostrum de qualité à temps

3 Développement de l'immunité du veau par la vaccination
 ➤ Intranasale contre les virus et/ou injectable pour élargir la couverture vaccinale

4 Assurer la continuité du protocole de prévention en amont et tout au long de chaque période à risque


PRÉVENTION PAR LA VACCINATION

Pour éviter des pertes de **CROISSANCE**



GMQ

Privilégiez la vaccination pour protéger vos animaux



des affections respiratoires :

Les maladies respiratoires altèrent les futures performances des animaux

Bactéries

Virus

Agents majeurs	Mannheimia haemolytica	VRSB
Agents secondaires	M. Bovis	Coronavirus
	H. Somni	PI3
	P. Multocida	

Les maladies néonatales – gastroentérites :

La survenue de diarrhées infectieuses à E. coli, Rotavirus, Coronavirus et Cryptosporidium, dans les premières semaines de vie peut être prévenue par la vaccination des mères au cours du dernier tiers de gestation

CROISSANCE

GMQ



Sources des données MSD, Zoetis, Elanco

Une gamme d'antiparasitaires ET de vaccins est disponible pour les adhérents au PSE de **SICAREV COOP** nous consulter Pour planifier vos besoins préventifs




Contactez votre Technicien pour toutes informations

CHAQUE PILIER EST UN SOUTIEN POUR L'AUTRE



Pression du microbisme



Résistance de l'organisme