



Delta®

Boostyx™

Aliment complémentaire à lécher pour ruminants

Caractéristiques

- Améliore la digestibilité et l'ingestion des fourrages.
- Hyper appétent et simple d'utilisation (libre-service). Très résistant aux intempéries.
- Complémentation pratique « tout-en-un » qui couvre les besoins essentiels en minéraux, vitamines et oligo-éléments.
- Du fait à sa faible teneur en humidité: faible dégradation des vitamines.
- Forte teneur en énergie (1,21 UFL/kg)

Composition

- Mélasse (déshydratée), matière grasse végétale, tourteau d'extraction de soja toasté, phosphate monocalcique, carbonate de calcium.

Constituants analytiques

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|--------|
| • Protéines brutes..... | 5,0 % | • Calcium..... | 2,0 % |
| • Cellulose brute..... | 0,2 % | • Phosphore..... | 1,0 % |
| • Matière grasse brute..... | 14,0 % | • Magnésium..... | 0,30 % |
| • Cendres brutes..... | 14,0 % | • Sodium..... | 0,15 % |
| • Humidité | max. 5 % | • Potassium..... | 2,70 % |
| | | • Sucres totaux..... | 38,0 % |

Additifs au kg

• Vitamines

- 3a672a Vitamine A..... 100.000 U.I.
- 3a671 Vitamine D3..... 20.000 U.I.
- 3a700 Vitamine E..... 350 mg

• Oligo-éléments

- 3b502 Manganèse (oxyde de manganèse (II)) 900 mg
- 3b603 Zinc (oxyde de zinc) 900 mg
- 3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) 60 mg
- 3b304 Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)) 12 mg
- 3b801 Sélénium (sélénite de sodium) 8 mg
- 3b8.12 Sélénium (séléénométhionine) 2 mg

Mode d'emploi

- Mettre à disposition des animaux, en libre-service, à proximité d'un point d'eau de préférence dans une zone ombragée, à l'abri du soleil direct.
- Prévoir un cube de Boostyx de 22,5 kg pour 15 brebis ou chèvres environ, ou 1 cube de Boostyx de 80 kg pour 40 animaux.
- Prévoir des consommations de :
 - Brebis : 35 à 40 g/jour, - Agneaux en fin d'engraissement : 20 g/jour, - Chèvres : 20 g/jour
- Distribuer uniquement aux ruminants disposant d'un rumen fonctionnel. En raison des teneurs élevées en vitamine A, D3 et oligo-éléments, limiter la distribution à hauteur de 2,5 % de la ration journalière.

Recommandations

- Une consommation plus importante est possible les premiers jours de distribution. Les animaux régulent leur consommation au bout de quelques jours.
- Boostyx est un indicateur : en cas d'alimentation mal équilibrée, une consommation excessive peut être observée.
- Veiller à bien contrôler les apports journaliers par la ration de base.
- Veiller à une nutrition équilibrée, aux bons états corporels et sanitaires.

Conservation

- 2 ans à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

DELTAVIT 
GROUPE CCPA

Cube de 22,5 kg
Cube de 80 kg