

- [Espèces](#)
- [Composition](#)
- [Propriétés](#)
- [Utilisation](#)
- [Mode d'emploi](#)
- [Précautions d'emploi](#)
- [Catégorie](#)
- [Conservation](#)
- [Présentation\(s\)](#)
- [BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE](#)

Dernière version de la monographie : 22/10/2019

Aliment complémentaire pour réduire le risque de fièvre vitulaire chez les vaches laitières

## Espèces



## Composition

Bolus intraruminal :  
Chlorure de CALCIUM : 67 %  
Eau : 32 %  
Sulfate de CALCIUM : 27 %  
(soit 42 g de calcium par bolus de 190 g)  
Polyéthylène-glycolglycérilricinoléate : 7 %  
Gomme xanthane : 0,1 %

## Propriétés

Après administration, l'enveloppe du bolus se dissout dans le rumen et le bolus se délite complètement en 30 minutes. Le chlorure de calcium se dissout instantanément alors que le sulfate de calcium se dissout plus lentement, ce qui assure un relargage prolongé du calcium adéquat.

## Utilisation

Chez les vaches, réduction du risque de fièvre vitulaire :  
— Apport de calcium aux vaches prédisposées à un déficit nutritionnel en calcium ;  
— Complément à la perfusion de calcium en accompagnement d'une thérapie calcique.

## Mode d'emploi

Voie orale.

*Vaches :*

- Apport de calcium au vêlage : 4 bolus.  
— 1<sup>er</sup> bolus aux premiers signes de vêlage,  
— 2<sup>e</sup> bolus à la suite du vêlage,  
— 3<sup>e</sup> bolus 12 à 15 heures après vêlage,  
— 4<sup>e</sup> bolus 24 à 30 heures après vêlage.
- Accompagnement d'une thérapie calcique : 2 bolus.  
— 1<sup>er</sup> bolus 2 à 3 heures après l'injection intraveineuse de calcium,  
— 2<sup>e</sup> bolus 12 à 15 heures plus tard.

BOVIKALC® s'administre au moyen de l'applicateur prévu à cet effet. La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation.

## Précautions d'emploi

N'administrer BOVIKALC® qu'au moyen de l'applicateur.

Ne pas administrer à des vaches dont le réflexe de déglutition est perturbé.

Ne pas administrer en cas de parésie.

Avant administration, veiller à ce que le bolus soit en parfait état et que son film protecteur soit intact.

Avant utilisation, il est recommandé de prendre l'avis du vétérinaire.

## Catégorie

Aliment complémentaire diététique.

## Conservation

Conserver BOVIKALC® dans un endroit sec, à une température inférieure à 30 °C.

Maintenir chaque bolus dans son emballage plastique jusqu'au moment de l'administration.

## Présentation(s)

**Boîte 6 x 4 bolus**

GTIN 04028691541424

**Boîte de 48 bolus**

GTIN 05703655002560

## BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Division Santé Animale  
12, rue André Huet  
CS 20031  
51721 REIMS CEDEX  
Tél. : 03.26.50.47.50