



Delta®

Deltaglycol®

Aliment complémentaire pour ruminants et lapines

Nouvelle
galénique

New
galenic

Caractéristiques

- DELTAGLYCOL est destiné aux vaches laitières avant le pic de lactation et aux brebis en fin de gestation dont les rations sont déficitaires en énergie.
- Intérêt particulier : avant et pendant un concours agricole ou un salon, pour donner un coup de fouet aux animaux.

Composition

- Propylène glycol, glycérine, sorbitol.

Constituants analytiques

- | | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| • Humidité | 70,2 % | • Cellulose brute | <0,1 % |
| • Protéines brutes | 4,5 % | • Cendres brutes | 2,4 % |
| • Matières grasses brutes | <0,1 % | • Sodium | 0,7 % |

Additifs au litre

- | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| • Vitamines | | • Substances aromatiques | |
| 3a890 Chlorure de choline | 12 g | Mélange de substances aromatiques | |
| 3a315 Niacinamide | 30 g | | |

Mode d'emploi

- **Distribution en drogage** : En début de lactation, directement dans la gueule, avec un pistolet.
Vaches laitières : 500 ml matin et soir pendant 2 à 4 jours.
Brebis et chèvres : 50 ml matin et soir pendant 2 à 4 jours.
- **Distribution en Propydose** :
Vaches Laitières :
 - En début de lactation : 300ml /jour pendant 15 jours.
 - Au long de la lactation pour les VLHP (> 40kg/j) : 150 ml/jour, pendant 15 jours.
- **Lapines** : 2ml/L à l'IA

Recommandations

- Ne pas administrer à des animaux couchés afin d'éviter tout risque de fausse déglutition.
- Ne pas utiliser pour d'autres espèces. Respecter les dosages recommandés.
- Craint le gel et les fortes températures (>35°C).

Conservation

- Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière, dans un endroit sec et aéré.

Fabriqué par un site
certifié OQUALIM-STNO.
Convient aux filières
"Nourri sans OGM < 0,9 %"

DE/CQ 210121 8

DELTAVIT 
GROUPE CCPA

Bidon 11 kg
Fût 66 kg
Fût 220 kg
Fût 1 100 kg

© Copyright, Janzé, Groupe CCPA