

- [Espèces](#)
- [Composition](#)
- [Propriétés](#)
- [Utilisation](#)
- [Mode d'emploi](#)
- [Précautions d'emploi](#)
- [Catégorie](#)
- [Conservation](#)
- [Présentation\(s\)](#)
- [VIRBAC FRANCE](#)

Dernière version de la
monographie : 28/10/2019

Mise à jour :
recherche internet : pas de
modification trouvée

Aliment complémentaire pour compenser les pertes en électrolytes chez les veaux et porcelets

Espèces



Composition

Poudre orale effervescente :

• **Ingrédients :**

Lactose, bicarbonate de sodium, poudre de lactosérum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, farine de caroube, farine de riz.

• **Additifs par kg :**

Glycine : 45 800 mg

Vanilline : 300 mg

Vitamine E : 500 mg

Sélénométhionine (soit 1 à 1,2 mg de sélénium) : 500 mg

Enterococcus faecium : $5 \cdot 10^{10}$ CFU

• **Constituants analytiques :**

Protéines brutes 5,4 %, Cellulose brute < 2 %, Matières grasses brutes 1,1 %,

Cendres brutes 18,3 %, Lysine 0 %, Méthionine 0 %, Sodium 6,24 %,

Potassium 2,11 %, Chlorure 4,18 %, Bicarbonate 9,65 %

Propriétés

Réhydratant effervescent, associant les éléments indispensables à la lutte contre les troubles digestifs (diarrhée) ou liés au sevrage : préparation aisée (effervescence), buvée facilitée par l'arôme vanille, apport en ions, assimilation favorisée par la gomme d'acacia.

Il contribue à la protection des muqueuses intestinales (vit. E et sélénium), aide à l'amélioration des fonctions digestives et de la consistance des selles (farines de riz et de caroube) et réensemencement du tube digestif : souche de bactéries lactiques non modifiée (*Enterococcus faecium*).

Utilisation

Chez les veaux et porcelets : stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau. Utiliser en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée) pendant et après ceux-ci.

Mode d'emploi

Voie orale.

Dissoudre 1 sachet de 100 g pour 2 litres d'eau de boisson à environ 38°C, dans du lait ou un lactoreplaceur.

— **Veaux :** administrer une buvée de 2 litres, 2 à 3 fois par jour. La reprise de l'alimentation habituelle se fera sans phase de transition.

— **Porcelets :** préparer des buvées de 2 à 4 litres et les renouveler afin de laisser boire le mélange à volonté. La consommation quotidienne dépend de l'âge et du nombre de porcelets.

Administrer les buvées pendant 2 jours. Prolonger jusqu'à 7 jours si nécessaire.

Un mélange de 2 litres apporte $0,5 \cdot 10^{10}$ CFU d'*Enterococcus faecium* et 50 mg de sélénométhionine (100-120 µg de sélénium).

Faire boire immédiatement après la préparation.

Précautions d'emploi

Conserver hors de la portée des enfants.

Catégorie

Aliment complémentaire diététique.

Conservation

Tenir à l'abri de l'humidité.

Présentation(s)

Boîte de 24 sachets de 100 g

GTIN 03597133061581

VIRBAC FRANCE

1ère avenue 3e rue LID
Espace Azur Mercantour
06515 CARROS CEDEX
Tél. : 0811.904.606